摛藻堂四庫

全書

薈

曾要


子部


欽定四庫全書管要母祭賢宗金鑑卷六十五


詳校官主事臣陳木

御祭醫宗金鑑卷六十五 欽定四庫全書會要 欠己ョ 眼胞痰核 眼胞菌毒 餓 眼 編輯外科心法要決目 眼丹 Ē At dista 錄

鼻部 金灰四月全書 鼻疽 鼻疔 皮翻證 漏睛瘡 栗瘡 椒瘡 目中努肉 卷六十五目録








古									
老六十五日蘇	齿莲蛙	走馬牙疳	矛雞	矛疔	鑽牙疳	矛宣	牙衄	齿部	金グロノイン
		•					-		卷六十五目録

齒齲 却見醫完全監

							T	
1	1							欽
	ĺ			· ·	1			飲定四庫全書 人
		1	_					四四
					-			床
		1	·					件
			ĺ					全
								書
	}							
	ı							
		İ		:	-		1	卷六十五目録
								卷車
}		1						六
	İ	:			Ì		1	十分
	1							五年
1		-						録
				-				
	!							
					1			
	i			1				
	÷							
	1		į		•			_ (
1			1					
				ì	1	!		
i		i	1	:			1	1
	· [Ì					






卷六十五

清凉圓 欽定四庫全書 當歸尾 赤芍藥各二錢 炒 磨濃塗之其血即止內服涼膈清脾飲忌海腥煎 潤眼皮菌毒處少項用左手大指甲墊於患根右 手持鈹鍼尖頭齊根切下血出不好即用翠雲錠 消有經年皮厚消之不應者法當用輕綿紙蘸水 御禁醫宗金鑑 川黄連生 石菖蒲

翠雲銀子 羌活五分 杭粉五雨 地庸子 歌清涼圓內用川連歸尾菖蒲芍膽礬羌活杏仁地 盾子菌毒初起洗之痊 乘熱蘸洗勿見塵土 共研粗末以大紅紬包之如櫻桃大甜滚水浸泡 膽礬二分 銅絲 杏仁各一錢

涼膈清脾飲 灾至可事 红 生地黄 黄連各一两 歌翠雲銀子能止血銅綠輕杭黃連强共為細末和 成錠菌毒切後塗之良 途患處 共為細末用糯米百粒水一盤煎半盤去米再煎 至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃以雞翎蘸 御纂醫宗金鑑 連翹去心 輕粉一錢 Ξ



灾足习事会書

御祭暫宗金鑑

圖

丹


眼



四

荆 防敗毒服有功 註此證由脾胃濕熱受風而成紅腫疼痛若腫輕下 丹眼胞上下生紅熱腫痛輕偏風脫熱紫硬偏於熱 眼 熱有日久消之不應者宜服透膿散膿熟鍼之腫 紫堅硬者偏於熱威也腫硬難消初起俱宜荆防 垂不能視物者偏於風盛也浮腫易消若脫紅色 丹 毒散散其風口渴便燒者宜內陳黄連湯寫其

卷六十五



圖

眼

鍼



金灰四月百十二


卷六十五

됇 足 日 車 全 書 脚等醫宗金盤 後風侵浮腫生 眼眼睫豆粒形輕者洗消膿不成甚則赤痛膿餓愈 成也候熟鍼之貼黃連膏亦有破後邪風侵入瘡 粒有尖初起輕者宜用如意金黄散鹽湯冲洗膿 此證生於眼皮毛睫間由脾經風熱而成形如豆 口令人頭面浮腫目亦澀痛者外仍洗之內服芎 眼 不成即消矣風熱甚者色赤多痛洗之不消膿已


号皮散 川芎二兩 歌芳皮散內用川芳青皮減半用最靈為末菊花湯 調服醫治鍼眼自成功 外以枯礬末雞子清調敷腫處 共為末每服二錢菊花湯調服 皮散即愈 又用南星末同生地黄捣膏貼太陽穴自消 青皮 卷六十五 兩

钦定四庫全書 柳蒙醫宗金盤 黄連青見具部具 如意金黄散見腫寫門

胞 核 眼 痰 圖 痰核生於眼上下肥含於皮裹皮色如常



一 定四庫全書 化堅二陳九 白殭難少雨 陳皮 致化堅二陳九消疾週身結核服更產陳皮半夏於 白茯苓一兩五錢甘草三錢 白滚水送下 共研細末荷葉熬湯合丸如梧桐子大每服二錢 即消貼貝葉膏收口從眼皮裏漬破者難斂 半夏各一兩 卷六十五 川黄連三錢



瘡

椒



新定四庫全書 |


粟 癚 圖 米磨生於上下眼皮裏形如黃米 御蒙醫宗金鑑

瘡赤硬熱難 椒 瘡栗瘡生胞裏脾胃血熱是根苗栗瘡黃輕濕易散 匹庫 · 療栗瘡 熱或故色亦形硬具瘡難消俱宜服清脾凉血湯 此二證生於眼胞之裏雖皆由脾胃血熱所致然 栗瘡偏於濕盛故色黃形輕其證易愈椒瘡偏 出 緑堆纍者乃血熱有瘀也法以燈草刮瘡處 一即愈 消 卷六十五 於

鱼

灾

養康 清脾凉血湯 赤芍 荆芥 連翹去心 厚朴薑炒 竹葉三十片水煎食遠服 即於過行白盡 生大黄酒洗 蟬蛻 黑參 防風 白鮮皮各一錢





一飲定四庫 血壅氣滞胃經原 註 皮翻 此證由胃經血壅氣滞而成小兒多有之眼皮外 證係眼胞翻狀如古抵唇一般翻因胞腫睫緊故 即愈亦有内翻者即目科拳毛倒腹弦弛不內外 翻者即目科胞垂難視之發也 證 眼皮亦翻治宜瀉脾胃之積熱以寫黃散服之 如以舌舐屑之狀又如痘風眼爛胞腫弦緊者 全書 海·蒙醫宗全鑑

為黄散 甘草三两 石膏五聚 稀益草四兩 歌寫黃散治皮翻證石膏梔子草防風稀為草同研 共研細末肚人二錢弱人一錢小兒六七分白滾 細末滚水調下有奇功 調下 The sale refer the day the 防風二兩 栀子仁生 兩 炒香

圖 瘡

畜 聙

漏




飲定四庫全書

祖言を言える金

青黑膿稀難長平 漏睛磨在大皆生肝熱風濕病睛明紅腫痛潰膿稠易 註此證生於目大皆由肝熱風濕病發於太陽膀胱 經睛明穴其穴之處係藏淚之所初起如豆如東 後用黄靈樂燃入產口兼貼萬應膏其口漸漸收 順 腫疼痛瘡勢雖小根源甚深潰破出黏白膿者 出青黑膿或如膏者險初宜服疎風清肝湯潰 古

漏晴瘡



萬應青俱見潰務門 黄靈樂 飲定四車全書 神暴醫宗金鐵 歌疎風清肝漏睛倉又除肝熱散風强歸为銀花苦 金銀花二錢 菊草於翹梔子薄荆防 燈心五十寸水煎食遠服 甘草五分。 圖肉努中目



卷六十五

目中努肉


努肉時覺或脹疼 目中努肉心火成實火大皆色深紅小皆紅絲淡虚火


註此證生於目两皆厥肉努出時覺疼痛總屬心火 所成然火有虚實如大皆紅肉色深紅者心經實 火也宜黑麥湯服之小皆紅綠色淡紅者心經虚 火也宜决明散主之外俱用清涼圓泡洗久久自


十六

とこうき

1. 2.5 脚質系醫宗金鑑







次足日華公 些

圖

疽

.




御祭醫宗金鑑

ナハ

鼻部 千金仙方托裏座 臭疽生於臭柱問肺經鬱火發督原堅硬色緊常本痛 鼻疽 註比證生於臭柱屬督脈經臭為肺敦故又屬肺由 肺經鬱火凝結而成堅硬色繁時覺木痛初宜服 木通海荷桔梗消之若腫痛不減勢欲作膿則宜 千金漏蘆湯宣鮮鬱毒次用仙方活命飲加梔子 卷六十五

黄芩一兩 朴消一兩 漏蘆 連翹一兩 甘草一 金漏蘆湯 共研末每用二錢水一鍾畫三片簿尚葉一錢煎 托裏透膿湯主之外治法按癰疽潰瘍門 一两 兩 甲心過飲食 白劍一兩 麻黄 大黄 积設 · 两五錢 兩 兩



圖

疔

臭



Na L. C.

È

一致定四庫全書 臭疗生在臭孔中臭家腫引腦門疼甚則唇腮俱浮腫 肺經火毒蟾離宫 臭疔 内攻以致神昏嘔喘臭腫如稅者逆 離宫錠堂之此證初起之時須當速治遲則毒氣 之再用蟾酥九研細末吹入鼻竅若腫硬外發用 比證生於臭孔內臭家腫塞脹痛引腦門甚則唇 俱作浮腫由肺經火毒凝結而成宜蟾酥九汗

雜宫缺見腫寫門 蟾酥九見疔瘡門 臭淵濁涕流臭中久淋血水穢而腥膽熱移腦風寒火 控 臭淵 腦砂因蝕腦 此證內因膽經之熱移於腦髓外因風寒凝鬱火 之若久而不愈臭中淋瀝腥穢血水頭眩虚量而 那而成鼻竅中時流黃色濁涕宜奇授藿香九服 垂蛇 → 中京な話家金園

欽 奇授藿香丸 霍香連枝葉八雨 定四庫全書 歌音授藿香臭淵流濁涕淋漓久不休豬膽汁合藿 痛 香末蒼耳湯下患可廖 後蒼耳子湯下或黃酒送下 研細末雄豬膽汁和丸如梧桐子大每服五錢食 但比證久則必虚當以補中益氣湯兼服之即效 者必係蟲無腦也即名控腦砂宜天羅散服之 卷六十五


補中益氣湯見清寫門 天羅散 とこり 歌天羅蟲極腦髓中頭痛鼻流血水腥絲瓜根燒研 無瓜藤近根處者 為末每用三錢食後黄酒送下 細末黃酒調服慣殺蟲 5 2.5 御纂醫宗金鑑 Ī

瘡

選

金灰四周白言

異題榜多生小兒真翅及兩傍



青蛤散 金定四庫全書 黄葵各五錢 石膏一兩 蛤粉儿雨 歌澤寫散治臭蟲患膿汁浸淫肺火毒澤瀉鬱金施方澤寫散治臭蟲患膿汁浸淫肺火毒澤寫 山梔生 草木甘草煎湯調送服 共研末每服一錢甘草煎湯調下 甘草各一錢 青黛三錢 輕粉


歌青 散金臭蟲消給粉青魚煅石膏輕粉黃藥研 瘡處 共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀薄塗 極 細香油拌塊涼水調 即如此经初入此 知


鼻


鼻瘡並鼻痔浸淫破爛俱生臭孔難以園畫

飲定四庫全書 **★**

| 鼻瘡肺熱生臭中燥乾如火微腫疼內服黄本外定痛 燥乾黄連膏潤靈 鼻瘡 註此證生於鼻竅内初覺乾燥疼痛状如粟粒甚則 抹之立效 臭外色紅微腫痛似火炙由肺經壅熱上攻臭竅 聚而不散致成此瘡內宜黃本湯清之外用油紙 ,粘辰砂定痛散送入臭孔內若乾燥者黃連膏







辛夷清肺飲 臭痔初起榴子形久垂紫硬碳氣通肺經風濕熱鬱 内服辛夷外點平 次已日事 全書 ₩ 御蒙醫宗金鑑 臭痔 註比證生於員內形如石榴子漸大下垂色紫微硬 撑塞臭孔礙人氣息難通由肺經風濕熱鬱凝滞 日點之漸化為水而愈宜戒厚味暴怒庶不再發 而成內服辛夷清肺飲以清肺熱外以硇砂散逐 主

辛夷六分 栀子生研 石膏煆 歌鼻痔辛夷清肺飲辛草膏知栀子本机把升麻百 百合 桃把葉三片塞及升麻三分 或加羌活防風連翹薄荷 水二鍾煎八分食遠服 麥冬去心錢 黄本各一錢 甘草五分 知母 卷六十五

码砂散見耳部耳痔内 訳を日車全書→神祭書宗金鑑 合麥或加羌活翹簿斟 圖剌

風


肺



を六十五

杹 肺 桃 註 風粉刺肺經熱面鼻疙瘩赤腫疼破出粉汁或結 肺 E 祀清肺飲 yt. 顛 風 如 自收功也 Þ 季屑色赤腫痛破出白粉汁日久皆成白屑 黍米白屑宜内服 證由肺經血熱而成每發於面鼻起碎疙瘩形 **州自收功** 粉刺 4 duto -/ 御祭醫宗金鑑 枇杷清肺飲外數顛倒散 芫 屑 形


顛 金灾 桑白皮二錢 甘草三分 人参三分 倒 职方 大黄 机把清肺机把藥参草黃連桑白皮黃藥同煎食 散 水一鍾半煎八分食遠服 173 月 石 丁丁 服肺風粉刺盡皆宜 黄檗 硫黄各等分 我 連一錢 私把 禁二錢 黄連一 炙



宣鬱活瘀緩緩痊 酒皶臭生準及邊胃火薰肺外受寒血凝初紅久紫黑 於定四事全書 柳葉當宗金鑑 註此證生於真準頭及臭兩邊由胃火熏肺更因風 寒外東血瘀疑結故先紅後紫久變為黑最為纏 倒散敷於患處若日久不愈以梔子仁九服之緩 四物湯俱可選用使紫衛流通以滋新血再以顛 治宜宣肺中鬱氣化帶血如麻黃宣肺酒凉血

酒皶臭

麻黄宣肺酒 歌方 麻黄 緩取愈 麻黄宣肺酒皶臭血熱上注外寒瘀麻黄並根入 **膿盡膿盡則紅色退先黃後白而愈** 早晚各飲三五杯至三五日出膿成倉十餘日 頭生酒五壺將藥入酒內重湯煮三炷香露一宿 酒泡重湯煮飲效不虚 麻黄根各二兩 则



栀子仁丸 清嚼下忌辛辣之物 歌栀子仁凡皶臭赤紫黑纏綿皆可施栀子為未黄 栀子仁研末黄蠟溶化和九如彈子大每服一九茶 歌京血四物皷臭紅散察化滞又調樂孝苓四物陳 蠟化九似彈子茶清食 氣弱者加酒炒黃耆二錢立效 紅草薑煎加酒入五靈

_						 	
灾							顛倒散見肺風粉刺
钦包日事 全書							141
Э							321
車							限
幺							見
叁							肺
							風
							粉
							刺
河							
御写套醫宗金鑑							
宗							
盔							
					1		İ
			i				
			1	ļ			j
							:
Ξ							i
+	i	1		1			
	!]	1	:	1		į
	:	į			1		
	į.	i·		:	;		

灾已日睡在生

御禁醫宗金鑑

圖 證

六 部 耳



中田

耳部 破 黑方暗藏耳竅生色黑根深椒目形痛如錐刺引 黑疔 流血水火毒攻 註 zt. 因 再用蟾酥九水調濃滴於耳家內立效毒甚者以 證生於耳竅暗藏之處由腎經火毒所發亦有 如錐刺 服 丹石熱藥積毒而成者色黑根深形 痛引腮腦破流血水急服蟾酥九汗之 如 腮 椒 腦 目


Ē

卷六十五

蟾酥九見疔瘡門 黄連解毒湯 **灾足日華至書** 黄檗 黄連 歌方 黃連解毒城痛瘡諸般方毒煩躁狂黃連本蘇生 黃連消毒飲球解之黃連解毒湯清之即蹇 梔子四味煎服保安康 水煎熱服 御氣醫宗金鑑 生栀子谷 黄芩 銭 五分 主

黄連消毒飲見頭部百會頭 紅風偏肝血熱成 耳疳時出黑臭膿青震白纏黃色停胃濕相東肝經火 耳疳 註此證耳內問腫出膿因膿色不一而名亦各殊如 兼而成宜眾胡清肝湯主之氣實火威者以龍膽 者名纏耳出黃膿者名停耳俱由胃濕與肝火相 出黑色臭腺者名耳疳出青腺者名震耳出白膿

滴 耳 核 歌方 ·Jr 瀉 滴耳油治耳疳證膿净滴之效更深 桃 然 自愈 用 油 許滴於耳内 肝湯服之惟風耳則出紅膿偏於肝經 四物 仁研 油 滴之俟膿淨換滴耳油時時滴入腫 湯加丹皮石菖 爛 梅油去渣得油一錢光水片二分每 清服之外俱用醬站 核 十二 桃 血熱宜 消 梅 内 生 油 自 用 肌



生地麥冬飲 只 E 日 年 全 十二 中家醫宗全塩 生地黄 歌生地麥冬耳姆鮮上焦血熱是其原各用五錢煎 食後清肺降火保平安 麥冬飲主之總以京血為急乃抽薪止沸之法也 水二鍾煎八分食後服 外以神塞九塞之即蹇 **弪數者以柴胡清肝湯服之腎脈虛數者以生地** 麥冬去五錢 キャ


神 沉香三分 麝 塞丸 歌神塞麝香生白裝沉糯同研麪糊九大如桐子薄 不香一分 如 **鼻俱出血塞兩耳** 左耳出血塞右具右耳出血塞左具左具出血 右耳右鼻出血塞左耳兩耳俱出血塞兩鼻兩 細末題糊為此如梧桐子大每九海鄉最之 糯米五十粒 生白礬

卷六十五

禁胡清肝湯 見頭部 鬚疽 飲定四庫全書 · 御祭醫宗金鑑 塞久令人必重聽 耳痔 童挺耳家生肝腎胃火凝結成微腫悶疼皮損破 註此三證皆生耳內耳痔形如櫻桃亦有形如羊奶 者耳章形類初生蘑菇頭大帶小耳提形若棗核 細條而長努出耳外俱由肝經怒火腎經相火胃 綿暴塞入耳臭衂血痊 耳章 耳挺 투

栀子清肝湯 白百百万 甘草五生 當歸 栀子生研 散 經 偶 點之漸漸消 積火凝結而成微腫悶疼色紅皮破不當觸 犯之痛引腦巔皆宜服施子清肝湯外用硇砂 \ 胡 石膏煩 丹皮各一錢 川芎 化 犯

钦定四庫全書 神纂醫宗金鑑 石凶 井夢子各 分所 雄黄各三分 砂散 码砂一錢 歌梔子清肝草痔挺腎肝胃火忽怒成芎歸眾与丹 皮草膏蒡芩連用有功 水二鍾煎八分食遠服 鋑 氷片五釐 黄芩 輕 粉 三九



一次 AU 日車 至 一 柳祭曹宗金鐵

圖


瘡

耳


旋



字粉散 穿粉散搽即成功 旋耳瘡生耳後縫瘡延上下連耳疼狀如刀裂因濕熱 旋 註 宜穿粉散樣之即可成功 **澹盛月虧則瘡衰隨月盈虧是以又名月蝕瘡也** 此證生於耳後縫間延及耳摺上下如刀裂之狀 耳瘡 色紅時津黃水由膽脾濕熱所致然此瘡月盈 卷六十五 则



鱼灾四厚全言 卷六十五



柳花散 黄蘗 肉桂 搽 爛 治之法也外以 赴筵散吐涎則效如口瘡舌乾黄硬作渴者宜 醇酒炙燒以致心脾實火妄動宜服凉膈 斑甚者肥舌俱腫脈實口乾此因過食膏粱厚 加減八味丸以 末 柳花散搽之實火者色艷紅滿口 青黛三錢 滋 腦香二分片 化 源 俱禁水 赦 散外

j


赴筵散 欽 栀子生 黄芩 黄蘗木 定四庫全書 共研細末每用少許搽於患處 柳花散治白口倉黄蘗青黛龍腦香肉桂共研茶 患處虚火上炎自平康 各研細再合一處研与每用少許搽於患處 柳茶醫宗金監 乾薑 黄連 細辛各等分 m †

加減八味丸 涼 甚則咽喉叠腫疼 奪口滿口白斑點小兒心脾熱所生初生多是胎中熱 鵞口瘡 **馬散見面發** 歌赴筵散醫實火攻口瘡斑 註 比證小兒多有之屬心脾二經之熱所生初生小 薑蘗細卒同研有神功 見清 湯門 爛色多紅本連梔子乾

水 灾 氷片五分 足日華全書 元明粉 硼 散 愈 重手血出無妨隨用水硼散搽之內服涼膈 紗一條裏節頭上熊新汲水指去白胎以淨為度 甚則 兒 則屬胎熱上攻所致滿口皆生白色斑點作 各五錢 咽 喉叠叠腫起難於乳哺多生啼叫法用青 御家務宗金強 硃砂六分 硼 砂 配品 散 即 痛


滿口糜爛色紅疼 涼 口康陰虚陽火成膀胱濕水溢脾經濕與熱寒薰胃口 膈散 歌方 口康 水硼散治咽腫 简吹之立效 明 共研極細末用少許搽於瘡處如咽喉腫痛以薦 粉研末樣之立見功 終面 泰部 痛口瘡白點滿口生水 小硼碌砂元


導赤湯 欽 定四庫全書一個祭務宗主題 **补通** 註比證由陽旺陰虚膀胱濕水泛溢脾經濕與熱疼 宜服導赤湯口臭寫泄脾虚濕者宜服連理湯康 爛 於口瘡色紅作痛甚則連及咽喉不能飲食初起 鬱久則化為熱熱氣薰蒸胃口以致滿口糜爛甚 服涼膈散外俱以薑藥散搽之有效 延及咽喉日輕夜重者服少陰甘枯湯便秘者 生地各二錢 四五



飲定四庫全書 🌉 少陰甘桔湯 桔梗二錢 陳皮 **\ 胡**名六分 川芎 連理胃熱脾虚濕口糜臭氣瀉泄俱參苓白术系 甘草乾薑黃連脾胃宜 水煎熱服 御祭醫宗金鑑 黄芩 甘草一錢 羌活 元参 型六

盖蘇散 乾薑 升麻各四分 歌少陰甘枯治口糜芳苓羌活枯陳皮元參以草升 麻共葱白水煎神效奇 慈白一根水二種煎八分食遠服 各研末共合一處研与乾搽口內溫水漱口 黄蘗春等分





· 飲定四年全書

圖

疔 唇

反



き


御纂醫宗金鑑

唇部 反脣疔 鎖口疔

胛胃心經火毒成 反唇方發唇裏稜鎖口疔在嘴角生栗米堅腫麻癢痛

註此二證俱由火毒而成及唇疗生於唇稜偏裏上 所屬二證初起形如果米色紫堅硬如鐵腫甚麻 唇屬脾下唇屬胃鎖口疗生於嘴角係心脾二經

型九



钦定四事私書

一 御祭醫宗金監

圖

疽


唇

一層強上下唇皆同



쿠

脾胃積熱乃其因 唇疽生於上下 唇寒熱交争毒氣深紫硬時覺木痛甚 脣疽 註此證生於唇無論上下左右由脾胃積熱所致色 紫有頭大者如李小者如棗腫硬如鐵時覺木痛 消者必欲溃破治法即按癰疽腫瘍溃瘍門 解貴金丸外用離宫錠途之即消若過數日猶不 則寒熱交作初宜服神授衛生湯裏實者服雙 All The 卷六十五



脣

繭,

繭唇上下唇皆同



新定匹庫全言!

卷六十五

繭唇脾胃積火成初如豆粒漸繭形痛硬清若翻花逆 父變三消定主山 繭唇 矮蛇 rt 蘭堅硬疼痛妨礙飲食初起及已成無內證 證由脾胃積火結聚而成初起如豆粒漸長若 者

歆

定四車全書 柳氣醫宗金監

垂

氣實宜服凉膈散若日輕夜重五心煩熱兩額

宜


用

蟾酥餅貼之院僧膏益之日久漸消或口渴

者

服清涼甘露飲若面赤口唇燥裂便秘者此屬

清凉甘露飲 葵冬去心 黄芩 銀栄 殼 變為上消中消下消之證屬山 若潰後如翻花時津血水者屬逆失於調治久 紅 髮炒 · 鄉虚數無力者宜服加減八味丸以 胡 犀角鎊 知母 桃 石 斛 把禁去毛客负 滋 水養 則 陰



			_			カロ
		İ				減
						1
						加減八味丸見溃疡門
						4
			Ì	;		見
			į			清
				1		瘍
] [1	ļ 1				PE
] .		ì				1
	1					
i			ļ			. 4
			i			1
		Ì				
					•	
				ŧ	!	:
		į				
					į	. !
					ĺ	

钦定四車全書 人

圖


風


脣

一唇風生在唇上下皆同



雙解通聖散 **久裂流水火燎疼** 脣風多在下脣生陽明胃經風火攻初起發癢色紅腫 脣風 發賽色紅作腫日久破裂流水疼如火燎又似無 比證多生下唇由陽明胃經風火疑結而成初起 之外以黄連膏抹之自愈 如風盛則唇不時関動俱內以雙解通聖散服





齒部 虚者反此當分别 牙級牙縫內出血胃腎二經虚實熱實多口臭牙堅字 牙衂 註此證由熱而成當分虚實無論大人小兒若胃經 實熱者則血出如湧口必臭而牙不動宜服清胃 湯甚則服調胃承氣湯或用酒製大黄末三錢以 枳殼五錢煎湯少加童便調服下黑糞即愈若胃

次 NU 日 . A. A. A. A. 一种首条留宗金鑑

五六

清胃湯 石膏四錢 滴 小薊散擦牙随用青竹茹醋浸一宿含散甚效 猴薑隨手應效若疳積氣盛兼服蘆薈丸外俱用 腎有火者六味地黄丸無火者七味地黄丸俱加 及補中益氣湯加黃連丹皮若腎經虚者血則點 經虚火者牙齦腐爛淡血渗流不已宜服二參湯 而出牙亦微痛口不臭而牙動或落者治宜滋 黄芩

卷六十五

調 钦定四車全書 一 甘草之錢 大黄 胃承氣湯 黄連 生地各一發 歌清胃陽明實火結口臭相兼齒衂血本連生地升 麻膏丹皮同煎功效捷 水二種煎八分食後服 酒四浸錢 御祭醫宗金鑑 芒消三錢 升麻各一錢 丹皮 錢五分 五+七

二参湯 歌二参湯醫虚火泛齦腐渗流血水淡人參元參各 歌調用承氣實火攻齒如口臭用之靈酒浸大黄芒 人參 等分水煎服下有神驗 水三鍾煎一鍾去渣少少温 消草胃熱煎服立刻清 水煎温服 元参各等分 卷六十五 服

蘆薈丸 たこう員 蓝色 麝香一錢 白雷丸 鶴虱草各一兩 川黄連 湯送下 共研末蒸餅糊九如麻子大每服一錢空心清米 一 御祭醫宗金鑑 木香三錢 白燕美 胡黄連 子青皮 五十八


金 蒲黄微妙 · 薊散 歌方 歌蘆首九醫積氣盛木麝青皮胡黃連無美雷九傷 **灾匹庫全** 小薊 小薊散探牙級方蒲黃微炒百草霜香附同研為 右研細末用搽牙上半刻時温茶激之 虱草川連同末蒸餅丸 末指牙止血功效强 香附子各五錢醋 百草霜 卷六十五


六味地黄丸見面部 門經客熱風寒侵 牙宣初起腫牙龈日漸腐頹久露根惡熱惡涼當細别 欠 味地黄丸即 中益氣湯見潰瘍 牙宣 己日事全書 神祭衛宗金鑑 註 牙宣露總由胃經客熱積久外受邪風寒涼相 此證牙銀宣腫龈由日漸腐頹久則削 子桂 見附 面地 雀 79 部黄 斑 頬 殤減 去 縮以致 五十九 搏 益

麻湯外俱用胡桐淚散擦之以食鹽冲湯漱口惟 宜 火而兼腎虚齒乃腎之餘宜服三因安腎九又有 留 趣內之間有喜熱飲而惡凉者係客熱受邪風稽 而成有喜凉飲而惡熱者係客熱遇寒凉凝滞於 越腐臭時津白膿者屬胃中濕熱宜服犀角升 獨活散外有牙龈腐臭齒根動搖者屬門中虚 於翻內之內客熱遇寒者牙齦出血惡熱口臭 服清胃湯客熱受風者牙觀惡凉遇風痛甚宜 卷六十五

獨活散 **文色日華白馬** 荆芥各一錢 防風 獨活 薄荷 床骨者逆 用固當白玉膏貼之緩緩取效若翻肉腐爛露牙 牙齦動搖或兼疼痛者日以李杲牢牙散擦之夜 / 御祭醫宗金鑑 細幸七分 生地 川芎各一錢六分 羌活 卆

三因安野九 金为四周日言 續斷各三兩 杏仁炒 補骨脂 ,獨活風毒注牙根嚴腫嫌涼痛臭禁羌活防風共 生地薄荷荆芥合芎辛 右為粗末每用二錢水煎澄渣食後服日用三服 眇 胡盧巴炒 山樂 川楝子炒 白茯苓 卷六十五






官粉の一両用り 欽 固齒白玉膏 定四 地骨皮 李果牢牙擦齒病牙龈摇動或兼疼膽草升麻 **地骨研末漱口搽有功** 供研末先以溫水漱口用少許茶之 庫 · 全 書 ****共升用** 兩 柳紫寶宗金鑑 大班 三錢 四 分 监水皮條 去五各防 渣鎾五風 再同錢當 入樂細歸 空砂 入辛川 調砂菜艺 内調本牙 煎内各皂


泉牙五錢 和匀乘熱攤紙上如膏冷將熨斗燒熱仰放紙鋪 用黄蠟三兩溶化濾净再化離火候温方入前樂 熨斗底上攤之用時先以溫 貼於患處閉口勿語 如监 此將 龍骨二兩 七龍 次骨を 去陽子 樂起五 汁石 水漱口將膏剪一 将火 龍煆 骨通 陽紅 起入 石樂 焙汁 乾内

證由肝胃積熱成 鑽牙疳在牙根生突出硬骨銳而鋒痛如鍼刺殊難忍 清胃湯見牙飯 犀角升麻湯見面部頰鴉 钦定四車至書 一 柳纂醫宗全鑑 鑽牙疳 註此證由肝胃二經積熱所致乃牙根肉內鑽出骨 歌固齒白玉貼牙效一切牙疼及動摇官粉珍珠陽 起麝龍骨象牙黄蠟熱 六

蘆薈消疳飲 蘆薈生 栀子生研 石膏鬼 換貼二次即止內服蘆薈消疳飲外以水硼散茶 之戒厚味其牙復生如舊 刺開好內連牙齊根取出若血出不止者以濕紙 尖如刺疼痛異常小兒多有之法用敏敏就患處 牛蒡子炒研 羚羊角鐐 卷六十五 黄連



若兼麻養即黑疗 鱼定四库全書 牙疗牙縫胃火成大肠濕熱亦可生腫如果米連腮痛 註此證由胃經火毒或大腸經濕熱皆可致之每生 麻癢破流血水疼痛異常者即黑疗也屬腎火毒 於兩旁牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項若兼 **毒肠即愈若失治毒反攻心令人煩躁昏愦者逆** 俱用銀簪尖挑破以見血為度茶拔方散再以婚 九喻化徐徐嗾之若煩躁口渴者宜服黃連解



牙癰胃熱腫牙床寒熱堅硬痛難當破流膿水未收口 犯寒涼多骨妨 牙癰 定四庫全書 註此證由陽明胃經熱毒所致生於牙床堅腫疼痛 處宣軟刺破搽氷硼散若初時堅腫破流血水久 煩嘔者蟾酥九汗之便秘者雙解貴金九下之腫 身發寒熱腮頰浮腫初宜服荆防敗毒散若大渴 不收口過食寒凉者必生多骨俟骨尖刺出搖則 卷六十五

歃

蟾酥九 水硼散見口部為口意 於定日車全書 · 御祭醫宗全盤 頑肉難脫不食凶 走馬牙疳證不輕癖積疹痘毒火攻牙根腐臭隨變黑 荆防敗毒散見項部 解貴金九見腫瘍 走馬牙疳 内 見疔瘡門 動始可取出其口方能収斂而愈 PF 腦疽 卒六

註此證多由解疾積火疹痘餘毒上攻最為迅速總 紫漸腐穿腮齒搖者宜蘆會散擦之如牙縫黑腐 府解毒湯外勢輕者俱用弱白散擦之若堅硬責 者兼服人參茯苓粥若疹痘餘毒所中者宜服清 若癖積毒火攻牙者初宜服蘆會消疳飲脾胃虚 因積火熱毒而成牙根作爛隨變黑腐臭穢難聞 之再用手法去其黑腐內見紅肉派鮮血者吉若 不盡及腐爛深坑藥不能到宜用勒馬聽微絲塞

飲定四庫全書 · 御纂醫宗金鑑 人参扶苓粥 疳者好後易犯由積火時時上攻也惟在調理飲 共研末同粳米一茶鐘熬成粥先以鹽湯將口激 稍有疎忽必致復發慎之慎之 貼青蓮青身熱不食者逆但此證惟與積攻牙成 食得宜如山藥栗子舊鄉甜辣等物俱當禁忌若 取時項肉難脫堅硬腐爛新開以致穿腮破唇宜 白茯苓六分 六十七

清疳解毒湯 連翹去心 柴胡各五分 犀角鎊 人中黄 歌人参茯苓善扶脾飲食短少服之宜二味研末加 粳米熬粥食之理胃虚 净後再食粥 黑参 知母生 川黄連生 牛蒡子炒研

獨白散 石膏一錢五分 荆芥 歌清疳解毒牙疳證疹痘餘毒化熱成中黄知連禁 **狗垢即婦人尿桶** 淡竹葉一錢燈心五十寸水二種煎八分食遠服 嘔加蘆 華根五錢 翹夢犀角麥膏荆芥風 5 J. J. 却集醫宗金點 錢中 防風各一錢 **六**十八

蘆薈散 新定匹庫全書 < 蘆薈一安 白霜梅焼存性 歌羽白散搽走馬府湖垢白霜梅白礬韭根茶葉煎 湯滌蘸洗腐肉數樂產 右研細末先用韭根松蘿茶煎成濃汁來熱以雞 翎離洗患處去淨腐肉見津鮮血再敷此樂日敷 三次若爛至咽喉以蘆筒吹之 黄桑五錢 枯白礬各二錢


钦 勒馬聽教絲 白砒末一 青綿斯碎 定四庫全書 歌蘆會散搽牙府爛色紫牙搖腮硬穿豪裏人言焼 人言五分用 存性再加黄藥末同研 共研細末先用米泔水液淨疳毒後軟此樂於堅 硬及腐處 言一分火燒存紅素五枚去核 御祭醫宗金鑑 青黛春三角 介九

青蓮膏 青黛二錢 白砒即人言 輕粉各一錢 歌勒馬聽撒府漸蝕牙縫腐黑急速施油調砒麝青 綿燻泔水漱口後塞之 將絲挑少許塞於牙根縫內日三易之 用香油拌匀用時先以清米泔水激口次用鑷尖 麝香五分 乳香


卷六十五


飲定四庫全書 人 御纂醫宗金鑑 蘆香消疳飲見鑽牙疳 齒藍 歌青蓮青貼腐疳宜化腐消堅效更奇乳麝白砒輕 粉黛研末油調紙攤之 至晚再贴 剪膏藥貼之至晓揭去再以泔水將口激淨吐之 **收之每於即時以泔水液淨口拭乾隨疳證大小** 右為細末用香油調稠薄攤紙上用鏈槌實陰乾 セナ


齒根腐爛出血膿 齒露齒內生小蟲胃經疼濕風火凝口臭只緣胃火盛 註此證係齒內生蟲由胃經瘀濕風火凝聚而成齒 攻所致也宜服玉池散外用雀麥連梃一把告狐 中炮炙令熱納口中熨齒外冷更易之取包置水 三十斤洗淨將麥剪長二寸以飲葉裹作五色廣 根脹痛腐爛時出膿血若口臭甚者胃火盛極上 一寸厚五分三年陳醋清之至日中時以兩包火



白馬懸蹄塞入靈 **齒龋風熱客陽明牙齦腫痛出臭膿遇風痛甚久宣露** 齒齲 註此盤由風熱客於手足陽明二經而成初起牙齦 歌玉池疏風療蟲牙津膿根爛激服佳歸立升防甘 吐之者用此方煎服更效 生薑三片黑豆三十粒水煎去渣候温含激冷則 地骨等辛薑葉豆槐花







繪圖監生臣實光國榜對官檢討臣盧 應 然